

【使用方法】

本剤は淡水専用の観賞魚用品です。

- ① 水槽内のコケが多い場合にはある程度取り除いてください。
- ② 殺菌灯を使用されている場合は電源を切ってください。電源を入れるのは投与終了後、まる1日経ってからにしてください。また、活性炭などの吸着系ろ剤は本剤の有効成分を吸着してしまうおそれがありますので取り出してください。
- ③ 付属の計量カップを使って下記の割合で4日間続けて投与してください。それ以降はコケの様子を見ながら添加を2日に1回にしてください（水槽別の詳しい使用量は下記表を参考にしてください）。投与する際は、あらかじめ1リットル程度の飼育水に下記規定量のANTI GREENを混ぜ、流れの強い場所に添加してください。また、本剤を使用している間はライトの点灯時間を普段の7割程度に減らしてください。

※水草の中には本剤を使用することで光合成を止めるものや変色するものがあります。そのような症状が見られた際は使用を中止してください。特にリシアやホソバミズゼニゴケ、南米産ウイローモス、ヒルムシロ科の水草等は影響を受けやすいので使用の際はご注意ください。

初日: 100ℓの飼育水に対して 6mlを添加 **2日目:** 100ℓの飼育水に対して 12mlを添加
3日目: 100ℓの飼育水に対して 18mlを添加 **4日目:** 100ℓの飼育水に対して 24mlを添加
以降: 100ℓの飼育水に対してコケの様子を見ながら2日に1回の割合でANTIGREEN24mlを添加、コケが見られなくなった時点で添加を止めてください。2日に1回の添加は最長でも添加初日から計上して2週間までにしてください。再度添加したい場合は1週間以上あけ、初日の添加量から始めてください。

■水槽別ANTI GREEN使用量例

	60cm水槽 約55ℓ	90cm水槽 約155ℓ	120cm水槽 約200ℓ	150cm水槽 約255ℓ	180cm水槽 約330ℓ
初日	3ml	9ml	12ml	15ml	20ml
2日目	6ml	18ml	24ml	30ml	40ml
3日目	9ml	27ml	36ml	45ml	60ml
4日目	12ml	36ml	48ml	60ml	80ml
合計量	30ml	90ml	120ml	150ml	200ml

*水槽別の水量は一般的なものです。特別サイズの水槽もありますので必ず水量を量ってから使用量を計算してください。また、濾過槽が大きい場合は、その分の水量を考慮に入れてください。

【水量計算: {高さ (cm) × 幅 (cm) × 奥行き (cm)} ÷ 1000 = 水槽水量 (リットル)】

コケ予防としてご使用いただく場合

初日投与量を1週間に1回投与してください。立ち上げたばかりの水槽には使用しないでください。

*本剤を使用している間に生体に異常が確認された場合はすぐに使用を中止し、生体を別の水槽へ移動、もしくは水を替えてください。

⚠ 注意

- 他の薬品との併用はお控えください。
- 本剤は皮膚に付いたりすると痒くなることがあります。ついてしまった場合はすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
- 水草や魚などの生体に直接かけないでください。害になる恐れがあります。
- 生体の病気や死亡についての補償は一切致しません。予めご了承ください。

使用上のご注意

- アクアリウム以外の用途には使用しないでください。
- 食用とする生体が入っている水槽には使用しないでください。
- 使用方法に従って、必ず適量をお守りください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 万一、誤って飲んだ場合はすぐに吐き出させてください。また、目に入ったり皮膚に付いた場合はすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。その後、医師に相談してください。
- 衣類やカーペット等に付いた場合は色落ちする可能性があります。使用する際は十分にご注意ください。

使用期限 開封後6ヶ月間、保存は冷暗所にて行なってください。